

2019 年 5 月 15 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類 アザミウマ類 ケムシ類	2000 倍	200～ 700L/10a	収穫 前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内	4 回以内 (塗布は 1 回内、 散布は 3 回以内)
さとうきび	カンシヤコハネナガカメムシ サトウキビチビアザミウマ アワヨトウ イナコ類 アブラムシ類 メイチュウ類		100～ 300L/10a	収穫 45 日前まで			4 回以内 (粒剤は1回 以内、水和剤 は 3 回以内)	5 回以内 (粒剤は 2 回以内、 液剤、水溶 剤及び水和 剤は合計 3 回以内)
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～ 4.0L) 当り 0.5L	定植 前日 ～ 定植時	1 回	灌注	4 回以内 (定植時ま での処理は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)	3 回以内 (育苗期の 株元散布、 定植時の 土壌混和及 び灌注は合 計 1 回以 内、散布は 2 回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ							3 回以内 (定植時の 土壌混和 及び灌注は 合計 1 回 以内、散布 は 2 回 以内)
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヒメダイコンバエ							4 回以内 (は種前の 培土混和は 1 回以内、 育苗期の株 元散布、定 植時の土壌 混和及び育 苗トレイへ の灌注は合 計 1 回以 内、散布は 2 回以内)
レタス	アブラムシ類 オオタバコガ カブラヤガ ナモグリバエ ハスモンヨトウ							4 回以内 (灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)
非結球 レタス								

2019 年 5 月 15 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ハモグリバエ類 アザミウマ類 シロイチモンジヨトウ	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～ 4.0L) 当り 0.5L	定植 前日 ～ 定植時	1 回	灌注	4 回以内 (灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)	4 回以内 (は種時の 土壌混 和、育苗 トレイへの 灌注及び 定植時の 株元散布 は合計 1 回以 内、生育 期の株元 灌注は 1 回以内、 散布及び 定植後の 株元散布 は合計 2 回以内)