

スタークルメイト液剤10（第21260号）

2019年11月6日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトアザールを含む農薬の総使用回数
稲	—	ウンカ類	30倍	3L/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
		ツマグロヨコバイ	16倍	1.6L/10a			散布	
		ウンカ類 カメシ類	1000倍	60~150L/10a			無人航空機による散布	
			300倍	25L/10a			空中散布	
			8倍	0.8L/10a				
			30倍	3L/10a				
さとうきび	—	カンシャコバ、ネカ、カメシ、 イコ類	1000倍	100~300L/10a	収穫45日前まで	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)	
だいず	—	カメシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマハエ	8倍	0.8L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		カメシ類 ダイズサヤタマハエ					空中散布	
えだまめ	—	カメシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマハエ	1000倍	100~300L/10a			無人航空機による散布	2回以内
							散布	
らっきょう	—	アザミウマ類 ハモグリバエ類	8倍	1.6L/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布	
いね科牧草	—	アブラムシ類	1000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
水田作物、畑作物 (休耕田)	ヨシ、ギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメシ類		60~150L/10a	—			