

散布が簡単!

水がいらない!
溶かさなくてよい!
すぐまける!



アブラムシ類



ヨトウムシ



カメムシ類



コガネムシ類



ネキリムシ類



3kg袋

切れ味鋭い速効性!

ランネット®

微粒剤F

切れ味鋭い
速効性!

ランネット® 微粒剤F

有効成分:メソミル……1.5%

特長

1
水がいら
ないので
手軽に
散布でき
ます。

2
周囲への
飛散が少
ない薬剤
です。

3
老齢幼虫
対しても
速効的で
、発生を
見てから
の散布で
防除可能
です。

4
作物への
残留期間
が短い
ので収穫
日近くま
で散布で
きます。

5
最終的に
水と炭酸
ガスに分
解し、環
境負荷の
少ない殺
虫剤です。

適用害虫と使用方法

2017年5月31日現在

| 作物名 | 適用害虫名 | 10アール当り 使用量(kg) | 使用 時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | メソミルを含む 農薬の総使用回数 |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------|---------------------------------|
| キャベツ | アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ | 3~5 | 収穫 14日前 まで | 3回以内 | | 3回以内 |
| | タマナギンウワバ アブラムシ類 | 4~6 | | | | |
| だいこん | アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ | 3~5 | 収穫 21日前 まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内) |
| | タマナギンウワバ アブラムシ類 | 4~6 | | | | |
| かんしょ | ハスモンヨトウ エビガラスズメ イモコガ ナカジロシタバ | 3~5 | 収穫 7日前 まで | 5回以内 | | 5回以内 |
| | コガネムシ類幼虫 | 6 | | | | |
| ばれいしょ | ヨトウムシ アブラムシ類 | 3~5 4~6 | | | | |
| | | | | | | |
| はくさい | ネキリムシ類 | 6 | 収穫 14日前 まで | 2回以内 | 地表面散布 | 2回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内) |
| だいず | ハスモンヨトウ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 | 4~5 | 収穫 14日前 まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| にんじん (北海道に限る) | キタネコブセンチュウ | 20~30 | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内 (は種前 の土壌混和 は1回以内) |

上手な使い方

1.まき過ぎに注意

微粒剤Fは粉剤の視覚でまくと10~20倍の付着量になりますから、まき過ぎないように、見た目の付着量は粉剤の1/10位にしてください。幼苗は特に注意してください。

2.動力散粒機での使い方

所定量の本剤を、動力散粒機で均一に散布してください。その際に、機械の調整や歩行速度などは、あらかじめ調整確認して散布してください。

3.散布筒での使い方

筒先を腰より高くしないで、手首をはげしく左右に振って、作物に均一にかかるように散布してください。

小面積の野菜畑用に、ランネット微粒剤F専用の散布筒もご用意しております。

■使用上の注意事項



- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤の散布は、地上1.5mの位置における風速が3m/秒をこえるときは行わないでください。
- 地上散布では散粒用多口ホース噴頭付き動力散粒機で散布してください。
- 小面積の野菜畑等で使用する場合はランネット微粒剤F専用の散布筒で散布し、手まきは絶対にしてしないでください。
- はくさいに使用する場合、作物にかかることと薬害を生ずるおそれがあるので、作物にかからないように注意して株元の地表面に散布してください。なお、散布後土壌との混和はしないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

■安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 作業中に、粉末等を吸い込んだ場合は、薬剤にさらされない場所に移し、安静にしてください。薬剤を多量に浴びたときには、衣服を脱ぎ、皮膚・眼をよく洗ってください。また、身体に異常を

感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。

- 本剤による中毒に対しては、硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。呼吸が困難な場合は気道を確保してください。口移し人工呼吸は行わないでください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼するとともにうがいをしてください。
- 本剤の散布に当たっては危害防止のため、散布対象作物が人の胸の高さ以上の場合は使用を避け、下に向けて散布してください。
- ハウス内など遮蔽された場所での使用はさけてください。
- 高温多湿時の長時間作業及び疲労時の散布はさけてください。
- 犬、猫、鳥などペット類、家畜が食べないようにしてください。

■魚毒

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■保管

- 直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記帳しましょう。

本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は2017年5月31日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

LAM1M01F



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>