

登録番号 第 21975 号

トレボンスター®粉剤 DL

●有効成分としてエトフェンプロックスとジノテフランを含み、稲のカメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ・フタオビコヤガ・ニカメイチュウ・コブノメイガの防除に効果を発揮します。

特長：●殺虫効果に加えてカメムシ類への吸汁阻害効果、ウンカ類への忌避効果が期待でき、より効果的に害虫の被害を抑えます。

●だいたいの害虫防除にも使えます。

トレボンスターは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

有効成分	エトフェンプロックス・・・0.40% ジノテフラン・・・0.20%	包装	3kg×8
性状	類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数 20以下	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

2010年6月9日現在の内容です。

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む農 薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	3～4kg/10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への処理及び側条 施用は合計1回以内、本田で の散布、空中散布、無人ヘリ散 布は合計3回以内)
	ニカメイチュウ コブノメイガ フタオビコヤガ	4kg/10a					
だいた	カメムシ類 フタオビコヤガ	3～4kg/10a	収穫14日前 まで	2回 以内	散布	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以 内、散布は2回以内)

については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意事項

- (1) 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- (2) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (3) 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別すること。
- (4) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - 1) ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - 2) 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (5) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法-----

- (1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2) 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。作業後はうがいをすること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨-----

- (1) 水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。また、養魚田及び養殖池等周辺での使用は避けること。
- (2) 散布後は水管理に注意すること。
- (3) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさげ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。