

登録番号 第 23365 号

フェルテラ®スタークル®箱粒剤 CU

特長： ●チョウ目害虫とウンカ類を同時かつ安定した防除が可能な水稻育苗箱専用の殺虫剤です。

フェルテラはFMC Corporation またはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。スタークルは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

有効成分	ジノテフラン・・・6.0% クロラントラニリプロール・・・0.75%	包装	1kg×12 3kg×6 10kg×1 (JA)
性状	類白色細粒	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

2020年6月10日現在の内容です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウカ類 イネズミムシ イネトオムシ ニカメテウ コブノメガ フタホコヤカ イネトムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌 約5%) 1箱当り 50g	は種前	1回	育苗箱の床土 又は覆土に均 一に混和する	1回	4回以内 (育苗箱への処 理及び側条施用 は合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計3回以内)
	は種時覆土前 ～移植当日		育苗箱の上か ら均一に散布 する。				
	移植3日前～移 植当日						
	ツマグロヨコバイ イネコマムシ イネコ類						

については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意事項

- (1) 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水してから田植機にかけて移植すること。
- (2) 本剤を床土又は覆土に混和処理する場合、処理後速やかに使用すること。また本剤を処理した床土又は覆土を放置しないこと。
- (3) 葉先枯れなどの薬害を生じることもあるので、散布ムラがないよう均一に散布すること。
- (4) 容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- (5) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨-----

- (1) 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- (2) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。