

登録番号 第 19847 号

ベクサー®1 キロ粒剤 (JA)

●低コスト稲作に貢献する経済的な粒剤タイプの除草剤です。
 特長： ●一発処理剤の効果をより安定させるのに役立ちます。
 ●田植同時処理が可能です。

ベクサーは科研製薬(株)の登録商標です。

有効成分	ペントキサゾン・・・1.5%	包装	1kg×12
性状	類白色細粒	有効年限	4年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

2012年8月8日現在の内容です。

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ	移植時	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	2回以内	田植同時散布 布機で施用	全域の普通期及び 早期栽培地帯	2回以内
		植代後～移植前7日 または移植直後～ ルビエ発生始期 ただし、移植後30日 まで				湛水散布		
いぐさ	水田一年生雑草	植付後～生育期 (雑草発生前)	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	2回以内	湛水散布	九州	2回以内

については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意事項

- 本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので時期を失ないように散布すること。特に、移植後5日以降に使用する場合は適用雑草の葉齢等をよく確認すること。
- 苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきは丁寧に、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除くこと。また、未熟有機物を施用した場合は特に丁寧にすること。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm程度)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 苗が水没するような深水状態では、葉鞘部に軽い褐変症状が出るおそれがあるので、水管理に注意すること。
- 以下の条件下では初期生育の抑制を生ずるおそれがあるので使用を避けること。
 - 砂質土壌の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)
 - 軟弱苗を移植した水田
 - 極端な浅植の水田および浮き苗の多い水田
- れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意すること。
- いぐさに使用する場合は既発生の雑草に対して効果が劣るので、雑草の発生前に時期を失ないように散布すること。また、本剤の1回散布のみでは十分な効果を得られない場合があるので、いぐさに適用のある薬剤との体系で使用する

こと。

- (8) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法-----

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
(2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨-----

- (1) 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
(2) 散布後は水管理に注意すること。
(3) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。