

登録番号 第 20962 号

三井東圧アルバリン<sup>®</sup>粉剤 DL

●斑点米カメムシ、ウンカ、ヨコバイ防除の切り札。  
 特長： ●カメムシ類には吸汁阻害で効率的に斑点米被害を抑えます。  
 ●だいず、えだまめの害虫防除にも使えます。

アルバリンはアグロカネショウ(株)の登録商標です。

有効成分	ジノテフラン・・・0.5%	包装	3kg×8
性状	類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数 20以下	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

2010年6月9日現在の内容です。

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	-	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 イトヨリス ニカメイチュウ アザヒコガ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人機散布は合計3回以内)
だいず	-	カメムシ類 フタスジヒメムシ ダイズサヤマバエ	3kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
えだまめ	-	カメムシ類 フタスジヒメムシ ダイズサヤマバエ	3kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、ササ、スサキ、セイヨウアサガリ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	3kg/10a	-	3回以内	散布	3回以内

\*については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

## 使用上の注意事項

- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫

防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

**人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法**-----

- (1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2) 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。作業後はうがいをすること。

**水産動植物に有毒な農薬については、その旨**-----

この登録に係る使用方法では該当がない。

**引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨**-----

通常的使用方法ではその該当がない。

**貯蔵上の注意事項**-----

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。