

2020 年 9 月 30 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペクチオピラトを含む農薬の総使用回数		
小麦	赤さび病	2000 倍	60～150 L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
キャベツ	株腐病 根朽病		100～300 L /10a						
	菌核病								
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病								
	ブロッコリー								黒すす病 根朽病
									菌核病
カリフラワー	菌核病								
きゅうり	灰色かび病								
	菌核病 うどんこ病								
すいか	うどんこ病								
	つる枯病								
メロン	うどんこ病	2000～4000 倍							
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病	2000 倍							
	うどんこ病	2000～4000 倍							
	ミニトマト	灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病	2000 倍						
ピーマン		灰色かび病 黒枯病 斑点病	2000～4000 倍						
		うどんこ病							
		白絹病	1L/株	株元灌注					
なす	菌核病 すすかび病 褐色斑点病 褐色円星病	2000 倍	100～300 L /10a			散布			
	ししとう						灰色かび病 うどんこ病		
黒枯病 斑点病									
かぼちゃ	つる枯病								
	うどんこ病								
にがうり ズッキーニ	うどんこ病								
オクラ	灰色かび病 うどんこ病								
いちご	輪斑病								
	しょうが						白星病		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオブラトを含む農薬の総使用回数
らっかせい	白絹病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	灰色かび病 菌核病 さび病						
豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く)							
だいず えだまめ	うどんこ病						
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病						
にら	白斑葉枯病 さび病 白絹病			収穫 7 日前まで	1 回		1 回
にら(花茎)				収穫前日まで			2 回以内
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～2000 倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布は 2 回以内)
	白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病						
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病						
セルリー	斑点病 菌核病						
にんじん	黒葉枯病						
パセリ	うどんこ病						
しそ	灰色かび病 斑点病						
しそ(花穂)							
小粒核果類 もも ネクタリン	黒星病 灰星病	200～700 L /10a		収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
おうとう	灰星病 幼果菌核病						
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病						
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 褐斑病 うどんこ病 さび病						

2020 年 9 月 30 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペクチオプラドを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニア病 黒点病 すす点病 すす斑病	2000 倍	200~700 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
かんきつ	灰色かび病 そうか病						
かき	落葉病						
てんさい	根腐病	200~400 倍	ペーパーポット 1 冊当り 1L (3L/m ²)	移植前	1 回	苗床灌注	4 回以内 (苗床灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)
	葉腐病	2000 倍	100~300 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	
食用ぎく	白さび病			2 回以内	3 回以内		
きく	灰色かび病 うどんこ病						
	ゆり			葉枯病 灰色かび病 うどんこ病			
チューリップ ^o	褐色斑点病 灰色かび病 うどんこ病						
りんどう	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病						
花き類・ 観葉植物 (きく、ゆり、 チューリップ、り んどうを除く)	灰色かび病 うどんこ病						
とうき	苗立枯病	500~ 1000 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5~4.0L) 当り 0.2L	育苗期	5 回以内	灌注	5 回以内

2020 年 9 月 30 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	うどんこ病	150g/10a	10 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	常温煙霧	3 回以内
なす		すすかび病						