

ノビエ3.5葉期
まで使える

水稲用中期除草剤

MIC ザーベックス® DX 1キログラム粒剤

シハロホップブチル...1.5% シメトリン...4.5% ベンフレセート...6.0% MCPB...2.4%

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

ザーベックスはOATアグリオ(株)の登録商標です。

最近問題の難防除雑草も余裕のデラックスで确实防除!!

MICザーベックス®DX1キログラム粒剤は従来のMICザーベックス®SM粒剤にさらにノビエに対して特異的な効果を示す**シハロホップブチル**を加え、ノビエに対する効果を強化するとともに処理適期幅を拡大した使いやすい水稲用中期除草剤です。
とりこぼした雑草や遅発生してきた雑草を一掃する仕上げ剤の特性を備えています。



アオミドロ



アゼナ類



アメリカセンダングサ




タウコギ



ホタルイ

ノビエの葉齢目安



ノビエ



クログワイ



農林水産省「稲発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」
に掲載された農薬です。



三井化学アグロ株式会社



ノビエ3.5葉期まで使える

新しい水稲用中期除草剤

MIC ザーベックス® DX1 1kg 粒剤

●人畜毒性：普通物*

ザーベックスはOATアグリオ(株)の登録商標です。
シング、アールタイプ、アルファープロ、クサトリーは、三井化学アグロ(株)の登録商標です。
スラッシュャは住友化学(株)の登録商標です。

*「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

1.処理適期幅が広い

シハロホップブチルの配合によりノビエに対する効果が強化されるとともに、使用時期はベンフレセートとの相乗効果により、ノビエ3~3.5葉期まで拡大され、広い処理適期幅を有しています。

2.難防除雑草に有効

ベンフレセート配合により、クログワイ等の難防除雑草に有効です。

3.仕上げ剤として有効

最近問題のアメリカゼナやタウコギ、アメリカセンダングサ等一年生広葉雑草、アオミドロなど藻類や表層はく離に対する仕上げ剤として有効です。

4.体系処理で余裕の効果

体系処理剤なので、雑草の発生に合わせて処理できます。

使用基準


作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ(東北を除く) ミズガヤツリ(北海道を除く) エゾノサヤマカグサ(北海道) ヘラオモダカ(北海道、東北、九州の早期) オモダカ(九州の早期を除く) シズイ(東北) クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) ヒルムシロ(東北、北陸を除く) アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸を除く)	移植後20~30日 (ノビエ3.5葉期まで) [移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]	砂壤土~埴土	全域(九州を除く)の普通期栽培地帯及び関東以西の早期栽培地帯
直播水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	稲5葉期~ノビエ3.5葉期まで 但し、収穫60日前まで [播種後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]		全域(九州を除く)

●10アール当り使用量：1kg ●本剤のみを使用する場合の使用回数：1回 ●使用方法：湛水散布
●総使用回数 シハロホップブチル剤：3回以内 シメトリン剤：2回以内 ベンフレセート剤：2回以内 MCPB剤：2回以内


2017年7月1日現在

有効な体系処理例(移植水稲の場合)


① 一般的な圃場の場合



② ホタルイ等が多い圃場の場合



③ クログワイ等が多い圃場の場合



使用上の注意事項

- 使用量に合わせて秤量し、使い切ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3~5日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行なってください。
- 移植前後又は播種後の初期除草剤による土壌処理との組合せで使用する場合には雑草の発生状況をよく観察し、時期を失わないように適期に散布するよう注意してください。
- 梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用を避けてください。
- 散布後の異常高温(急激な温度上昇、梅雨明け前後の高温)が予想される時は使用しないでください。
- 本剤はホルモン作用を持つ除草剤で、処理後低温が続く場合は稲苗の生育抑制などの被害を生じるおそれがあるので、処理時期の

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

*本印刷物は2017年7月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例にあてはまるものではありません。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

ZDX1101F



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋一丁目19番1号 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>