

2020年8月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	インドキカルブ [®] 及 びインドキカルブ [®] MPを含む農薬 の総使用回数			
キャベツ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナギンウワバ ハイマダラノメイガ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内			
	コナガ アオムシ	1000～ 2000倍								
はくさい	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	2000倍						収穫21日 前まで		
だいこん	コナガ アオムシ			収穫14日 前まで						
ブロッコ リー	シロイチモジヨトウ	1000倍		収穫前日 まで						
ねぎ	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000倍		800 mL/10a				収穫7日前 まで	無人 航空 機に よる 散布	2回以内
いちご トマト	テントウムシダマシ類									
なす	オオタバコガ									
ピーマン	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ									
レタス 非結球 レタス	ハスモンヨトウ	8～16倍		100～ 300 L/10a				発生初期	3回以内	4回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ									
だいず	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000倍	3回以内		4回以内					
かんしょ	ハスモンヨトウ									
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍	3回以内	4回以内						
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ									
きく	ハスモンヨトウ	2000倍	3回以内	4回以内						

トルネードエースDF（第22766号）（1/2）

2020年8月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	インドキカルブ [®] 及 びインドキカルブ [®] MPを含む農薬 の総使用回数
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000倍	100～ 180 L/10a	収穫10日 前まで	1回	散布	1回