



スタークル®

顆粒水溶剤



農林水産省「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に掲載された農薬です。

スタークルは三井化学アグロ株式会社の登録商標です。



適用拡大!!

【作物名の追加】

- 食用コスモス

【適用害虫名の追加】

- かぼちゃ：コナジラミ類
- さとうきび：サトウキビチビアザミウマ

【作物名の分離】

うり類(漬物用)→うり類(漬物用、ただし、とうがんを除く)、とうがん

【使用時期の変更】

とうがん：収穫前日まで

(2020年1月29日の拡大登録内容より抜粋)

野菜等の登録は裏面をご覧ください。

果樹・野菜・水稻・茶・花きの多様な場面で活躍します!

■適用害虫及び使用方法(水稻・果樹・茶・さとうきび・てんさい・だいす・あすき・えだまめ・花き・樹木類・水田作物・畑作物(休耕田)・いね科牧草)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
稲	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	7日前			4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000					
りんご	アブラムシ類 キンモンホンガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類				3回以内		3回以内
もも ネクタリン	モモチョッキリゾウムシ アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類						3回以内
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類				2回以内		2回以内
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウコクナシキジラミ	2000					3回以内
かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノハタムシガ アザミウマ類						4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)
マンゴー	チャノキアザミウマ			前日		散布	
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類		200~700ℓ/10a				3回以内
ぶどう	カメムシ類 ブドウラカミキリ フタテンヒメヨコバイ	3000			3回以内		3回以内 (塗布は1回以内)
かんきつ	チャノキアザミウマ コナカイガラムシ類	1000~2000					3回以内
	ゴマダラカミキリ	1000					
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンバエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノミドリヒメヨコバイ アオバハゴロモ	2000					
	あけび(果実)	2000		14日	2回以内		
キウイフルーツ	カメムシ類	1000~2000			3回以内		3回以内
びわ	カメムシ類 ビワキジラミ	2000		前日		2回以内	2回以内
オリーブ	カメムシ類			14日			
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	50	100mℓ/株	育苗期	5回以内	株元 灌注	5回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
茶	チャノホンガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキアザミウマ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ	2000	200~400ℓ/10a	摘採7日	2回以内		2回以内
さとうきび	アブラムシ類 カンジャコバネガカメムシ サトウキビチビアザミウマ		100~300ℓ/10a	収穫45日前	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水溶剤は合計3回以内)
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ	2000~3000	1000~2000	7日	2回以内		3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
	カメムシ類						
てんさい	テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100~200	5ℓ/バー ポット6冊 (2.5ℓ/m ²)	移植前	1回	灌注	
	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100~240	6ℓ/バー ポット6冊 (3ℓ/m ²)				
だいす	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ	2000			2回以内		3回以内 (は種時の土壌 混和は1回以内、 散布は2回以内)
	フタスジヒメハムシ	3000					
あすき	アブラムシ類				3回以内		3回以内
えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内	散布	2回以内
	フタスジヒメハムシ	3000					
花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	2000~3000	1ℓ/m ²	発生初期		灌注	
	ハモグリバエ類	1000					
きく	アブラムシ類 コナジラミ類	2000~3000	100~300ℓ/10a	5回以内	5回以内	散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	カメムシ類	2000					
	ハモグリバエ類	1000~2000	1ℓ/m ²				
樹木類(つつじ類、つばき類を除く)	ケムシ類	2000	100~700ℓ/10a	発生初期		散布	5回以内
つばき類	チャドクガ	100	0.5~2ℓ/樹 (但し、220ℓ/10aまで)		2回以内	株元 灌注	5回以内 (株元灌注は2回以内)
つつじ類	ツツジギンバイ ケムシ類		100~300ℓ/10a		5回以内		5回以内
水田作物、畑作物(休耕田)*	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a			散布	3回以内
いね科牧草	アブラムシ類		100~300ℓ/10a	7日			

*ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類	20~40g/樹	発芽前~ 発芽期	1回	本剤1g当り水1mℓの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)
ぶどう	クアカスカシバ	40g/樹	幼果期まで但し、 収穫30日前まで			3回以内 (塗布は1回以内)

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。

本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は2020年1月29日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

STW1W02X

■適用害虫及び使用方法 (野菜)

(2020年1月29日付拡大登録内容を含む)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
とうもろこし(子実)	ムギクビシアブラムシ、カメムシ類			前日	3回以内		3回以内
未成熟とうもろこし	アブラムシ類、カメムシ類						
ばれいしよ	ワタアブラムシ	2000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内	散布	2回以内
かんしょ	アブラムシ類、コナジラミ類			3日	1回	散布	1回
トマト ミニトマト	カメムシ類	2000~3000		前日	2回以内		
	コナジラミ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	鉢上時又は定植時	1回	灌注	
ブロッコリー	アブラムシ類、コナガ						
	アブラムシ類	2000~3000		3日			
ピーマン なす	コナジラミ類						
	アブラムシ類	3000					
とうがらし類	アザミウマ類、カメムシ類	2000		前日			
	コナジラミ類	2000~3000	100~300ℓ/10a		2回以内	散布	下表参照***
とうがらし(葉)	アブラムシ類	3000					
	アザミウマ類	2000		14日			
かぼちゃ	アブラムシ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	
	アブラムシ類、コナジラミ類	2000					
ズッキーニ	アブラムシ類	2000~3000		前日			
きゅうり	コナジラミ類、アブラムシ類	2000~3000					
	アザミウマ類、ウリハムシ	2000					
きゅうり(葉)	アブラムシ類、アブラムシ類	3000		3日			2回以内
きゅうり(花)	コナジラミ類	3000		前日			
すいか	アブラムシ類	2000~3000		7日			下表参照***
まくわうり	アブラムシ類	3000					2回以内
メロン	コナジラミ類	2000~3000	100~300ℓ/10a		2回以内	散布	
	アザミウマ類	2000		3日			
	アブラムシ類	3000					
うり類(漬物用、ただしとうがらを除く)	コナジラミ類、アザミウマ類	2000					
	アブラムシ類	2000~3000		7日			
とうがん	アブラムシ類	2000~3000					
	コナジラミ類、アザミウマ類			前日			
にがうり	コナジラミ類	2000					下表参照***
セルリー	アブラムシ類			14日			下表参照***
キャベツ	アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ	50~100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	
	アブラムシ類	2000~3000					
はくさい	キスジノミハムシ	2000		3日			
	アブラムシ類	2000~3000			2回以内		
だいこん	キスジノミハムシ	1000	100~300ℓ/10a	7日		散布	
	アブラムシ類	2000~3000					
クレソン	アブラムシ類	3000		3日	3回以内		3回以内
レタス 非結球レタス	アブラムシ類	2000~3000			2回以内		
	ハスモンヨトウ	50					
ねぎ	アブラムシ類、ナモグリバエ	50~100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	
	アザミウマ類、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、タネバエ、ネギコガ	50					
ねぎ	アザミウマ類	2000	100~300ℓ/10a	3日	2回以内	散布	下表参照***
		1000	1ℓ/m ²				
	ハモグリバエ類 トビイロヒョウタンゾウムシ	400	0.4ℓ/m ²		1回	株元灌注	
クロバネキノコバエ類	1000	1ℓ/m ²					

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
わけぎ	アザミウマ類	2000	100~300ℓ/10a	3日	2回以内	散布	
	ハモグリバエ類	400	0.4ℓ/m ²	生育期 但し、 14日	1回	株元 灌注	下表参照***
にら	クロバネキノコバエ類	1000	1ℓ/m ²				
	ネギアザミウマ	400	0.4ℓ/m ²				
	アブラムシ類		100~300ℓ/10a	前日	2回以内		
アスパラガス	アザミウマ類、ジュウシホシクビナガハムシ、コナジラミ類、カメムシ類	2000	100~800ℓ/10a		3回以内	散布	3回以内
にんじん	アブラムシ類		100~300ℓ/10a	7日	2回以内		
	トビイロヒョウタンゾウムシ クロバネキノコバエ類	400	0.4ℓ/m ²	生育期 但し、 21日	1回	株元 灌注	
しゅんぎく	アブラムシ類	3000		前日			
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	2000					下表参照***
	アブラムシ類						
ほうれんそう	アブラムシ類、ウリハムシモドキ	3000					
非結球 あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く) なばな類 かぶ	アブラムシ類			3日			
	キスジノミハムシ	2000					
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟さざげを除く)	アブラムシ類 ハモグリバエ類			7日	2回以内		2回以内
	未成熟さざげ						
さやいんげん	コナジラミ類	2000					下表参照***
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類、ハモグリバエ類、ウラナミジミ			前日			
モロヘイヤ	アザミウマ類						2回以内
オクラ	アブラムシ類						下表参照***
らっきょう	アザミウマ類				3回以内		3回以内
しょうが	クロバネキノコバエ類						下表参照***
パジル	コナジラミ類、アブラムシ類		100~300ℓ/10a			散布	2回以内
しそ	アブラムシ類、ウリハムシモドキ						下表参照***
しそ科葉菜類 (しそ、パジルを除く) しそ(花穂) アマランス(莖葉)	アブラムシ類	3000		3日	2回以内		2回以内
わさび	アブラムシ類、ナトビハムシ	2000		畑育苗期	3回以内		3回以内
畑わさび							
しよくようほおすき 食用ミニバラ 食用カーネーション 食用金魚草 食用パンジー 食用トレニア 食用なでしこ 食用プリムラ 食用エキゾチカ 食用せんいちこう	アブラムシ類 コナジラミ類	3000		3日			2回以内
食用コスモス							
食用ざく				7日			下表参照***
なんてん(葉)	アブラムシ類						2回以内
すいぜんじな				3日			
ふき	コナジラミ類	2000		7日			下表参照***
せり※	アブラムシ類			3日	3回以内		3回以内
せり(水耕栽培)※※							

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前日数を示します。 **セル成型育苗トレイ、ペーパーポットは30×60cm使用土壌1.5~4.0ℓ(トマト、ミニトマト、ブロッコリー、かぼちゃ、レタス、非結球レタス、ねぎ)、約3ℓ(キャベツ)

※適用場所: 水田 ※※適用場所: ガラス室等の施設

***ジノテフランを含む農薬の総使用回数

きゅうり とうがらし類 すいか	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	トマト ミニトマト	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	かぶ、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)、なばな類、ほうれんそう	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
にがうり、うり類(漬物用、ただし、とうがらを除く)、食用ざく、セルリー、とうがらし(葉)、しそ、とうがん	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ブロッコリー はくさい	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	だいこん	5回以内(は種時の播種土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)
かぼちゃ	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	キャベツ	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	チンゲンサイ しゅんぎく	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
ズッキーニ	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ねぎ	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	オクラ、さやえんどう、実えんどう、さやいんげん、しょうが	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)
なす ピーマン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	わけぎ	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	にんじん	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
メロン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	にら	3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	ふき	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
		レタス 非結球レタス	4回以内(は種時の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)		