

MICアディオン乳剤（第22431号）（1/4）

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数																			
なし	アブラムシ類 シクイムシ類	2000～3000倍	200～ 700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内																			
	ハマキムシ類 カメムシ類	2000倍																								
もも	カメムシ類	2000～3000倍		200～ 700 L/10a	収穫7日前まで		6回以内	散布	6回以内																	
	シクイムシ類 アブラムシ類																									
	モモハモクダリガ																									
	ハマキムシ類																									
かき	カキノハタムシガ カメムシ類 チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍		200～ 700 L/10a	収穫7日前まで		5回以内	散布	5回以内																	
	カキクダアザミウマ	2000倍																								
キウイフルーツ	キロマイコガ	2000～3000倍			200～ 700 L/10a		収穫7日前まで		5回以内	散布	5回以内															
	カメムシ類	2000倍																								
くり	クリタマハチ	1000～2000倍					200～ 700 L/10a		羽化脱出期 但し収穫14日 前まで		6回以内	散布	6回以内													
	クリシキソウムシ	2000倍																								
かんきつ	ミカンハモクダリガ アブラムシ類	2000～4000倍							200～ 700 L/10a		収穫14日前まで		6回以内	散布	6回以内											
	チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍																								
	カメムシ類	2000倍																								
いちじく	アザミウマ類 アブラムシ類	2000倍									200～ 700 L/10a		収穫前日まで		2回以内	散布	2回以内									
	イチジクヒトリモトキ	3000倍																								
アロニア	シクイムシ類	2000倍											200～ 700 L/10a		収穫14日前まで		3回以内	散布	3回以内							
さるなし	キロマイコガ																									
ネクタリン	カメムシ類	2000～3000倍													200～ 700 L/10a		収穫7日前まで		3回以内	散布	3回以内					
	シクイムシ類 アブラムシ類																									
	モモハモクダリガ		2000～4000倍																							
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ウリハムシ	2000～3000倍	100～ 300L/ 10a			収穫前日まで											3回以内		散布		6回以内 (乳剤は3回 以内、粒剤は 3回以内)					
ズッキーニ	アブラムシ類 フキノメイガ																									
にがうり	アブラムシ類 カメムシ類 タバコカスミカメ ヨトウムシ類 フキノメイガ					2000～3000倍																100～ 300L/ 10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
	すいか メロン かぼちゃ																									
				いちご																						
				ごぼう																						
しゅんぎく	ハクサイタニ			4000倍	100～ 300L/ 10a	収穫7日前まで		2回以内		散布													2回以内			
	アブラムシ類			2000～3000倍																						

MICアディオン乳剤（第22431号）（2/4）

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数
だいず	マメシクイカ <sup>ダ</sup> ジヤカ <sup>ダ</sup> イモヒゲナカ <sup>ダ</sup> アブラムシ フタスジヒメハムシ マメハシヨウ ツメクサカ <sup>ダ</sup>	3000倍	100～ 300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	マメシクイカ <sup>ダ</sup> ジヤカ <sup>ダ</sup> イモヒゲナカ <sup>ダ</sup> アブラムシ	24倍	0.8 L/10a				
うめ	アブラムシ類	3000倍	200～ 700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ピーマン		2000～3000倍	100～ 300 L/10a		5回以内		5回以内
とうがらし類	アブラムシ類	2000～3000倍		100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布
	タバコカ <sup>ダ</sup>	2000倍	収穫3日前まで				
キャベツ	アオムシ コナカ <sup>ダ</sup> アブラムシ類 ヨトウムシ タナキ <sup>ダ</sup> ソウリハ <sup>ダ</sup>			4000～8000倍	0.5 L/m <sup>2</sup>	収穫21日前まで	2回以内
	ネリムシ類						
はくさい	アオムシ コナカ <sup>ダ</sup> アブラムシ類 ヨトウムシ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
だいこん	アオムシ コナカ <sup>ダ</sup> ヨトウムシ ハイマダ <sup>ダ</sup> ラノメカ <sup>ダ</sup> ダ <sup>ダ</sup> イコンサルハムシ			2000～3000倍	収穫30日前まで		4回以内
	かぶ	アオムシ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
茎ブロッコリー	収穫7日前まで				3回以内	3回以内	
ブロッコリー カリフラワー	コナカ <sup>ダ</sup>	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫3日前まで	5回以内	散布	5回以内
	アブラムシ類	2000～3000倍			2回以内		2回以内
非結球レタス (リーフレタスを除く)	アブラムシ類	2000～3000倍	100～ 300 L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
レタス					5回以内		5回以内
リーフレタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	3000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
トレビス	アブラムシ類				3回以内		3回以内
たまねぎ	アサミマ類 ネギコカ <sup>ダ</sup> ハスモンヨトウ	3000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
ねぎ	アサミマ類 ネギコカ <sup>ダ</sup>				3回以内		3回以内
		シイモシ <sup>ダ</sup> ヨトウ	2000倍				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ヘルモリン を含む 農薬の総 使用回数
ハスカップ	ハマキムシ類 アブラムシ類	2000~3000倍	200~ 700 L/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内
にんにく	ネギコガ アブラムシ類			収穫前日まで			4回以内 (乳剤は2回 以内、粒剤は 2回以内)
アスパラガス	ジュウホシクビナガハムシ カメムシ類	2000倍			3回以内		3回以内
	ヨトウムシ アブラムシ類						
はこべ	オオハコガ	3000倍		収穫21日前まで	1回		1回
さやいんげん	カメムシ類	3000倍			3回以内	散布	3回以内
豆類 (未成熟、ただ し、さやいん げん、さやえ んどう、未成 熟そらまめを 除く)	アザミウマ類 アブラムシ類 ハメグリハエ類 ヨトウムシ類 ウラナシジミ アズキノメイガ マメシクイガ						
未成熟そらま め							
さやえんどう	ヨトウムシ類 ハメグリハエ ウラナシジミ						
ほうれんそう	アブラムシ類 ハクサイタバニ	3000倍		100~ 300 L/10a	2回以内		2回以内
しそ	ハスモンヨトウ ウリハムシトビキ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	4000倍			2回以内		4回以内 (乳剤は2回以 内、粒剤は2 回以内)
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2000~3000倍			3回以内		3回以内
ミニトマト		3000倍			1回		1回
なす	アブラムシ類	2000~3000倍			3回以内		3回以内
	オンシツコナジラミ テントウムシダマシ類 カメムシ類	2000倍					
なばな	コナガ						
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	2000~3000倍			4回以内		4回以内
とうもろこし	アヲノメイガ アブラムシ類	2000倍 3000倍					
あずき	アズキノメイガ	2000倍			3回以内		3回以内
	アブラムシ類	3000倍					
やまのいも	アブラムシ類 ヤマノイモコガ アザミウマ類	2000~3000倍			5回以内		5回以内
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍					
		アブラムシ類 スズメガ類	3000倍				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数	
さといも （葉柄）	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	アブラムシ類	3000倍						5回以内
かんしょ	イモガ							
茶	チャノコクモシハマキ	2000倍	200～ 400 L/10a	摘採14日前まで	1回		1回	
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノキイロアザミウ	2000～3000倍						
そらまめ	アブラムシ類	3000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
オクラ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 カメムシ類	2000倍		収穫前日まで				
非結球あぶら な科葉菜類（ しろな、みず な、なばな類 を除く）	アオムシ							2000～4000倍
しろな								
みずな	アブラムシ類 ダクイオンハムシ ヤサイゾウムシ	3000倍		収穫7日前まで				2回以内
	アオムシ	2000倍						
つるむらさき	ヨトウムシ			2000倍		収穫14日前まで		3回以内
食用亜麻	ヨトウガ	収穫3日前まで						
ごま	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで		5回以内		5回以内
食用ゆり				収穫14日前まで				
葉ごぼう								
はまなす （果実）	シクイムシ類	2000倍	200～ 700 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
花き類・ 観葉植物 （はばたんを除 く）	アブラムシ類	2000～4000倍	100～ 300 L/10a	発生初期	6回以内	6回以内		
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類	2000倍						
はばたん	アブラムシ類	2000～4000倍	200～ 700 L/10a	発生初期	6回以内	6回以内		
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類 アオムシ	2000倍						
樹木類 （くちなしを除 く）	ケムシ類 アブラムシ類 ジャクトリムシ類	4000～8000倍	200～ 700 L/10a					
くちなし	アザミウマ類	2000倍						