

果菜類・葉菜類の害虫防除に。

MIC

野菜散布用殺虫剤

ベネビア[®] OD



追加となりました!
 ●未成熟とうもろこし害虫
 ●銅剤の混用事例

powered by
CYAZYPYR[®]
 ACTIVE INGREDIENT

■適用害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

2020年7月現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ ウツバ類、オオタバコガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、キスジノミハムシ	2000倍					
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ カブラハバチ、ダイコンサルハムシ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、ハモグリバエ類 キスジノミハムシ	2000倍					
	ヨトウムシ	4000倍					
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ	2000~4000倍					
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000~4000倍					
	ハモグリバエ類、コナジラミ類 アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類 ハモグリバエ類、ウリノメイガ	2000倍					
	オオタバコガ、ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000倍					
レタス 非結球レタス	ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍					
	オオタバコガ	2000~4000倍					
ピーマン	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	2000倍					
	オオタバコガ	2000~4000倍					
ししとう	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	2000倍					
	ハスモンヨトウ	2000~4000倍					
いちご	アザミウマ類	2000倍					
	アブラムシ類	4000倍					
アスパラガス	アザミウマ類	2000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
オクラ	アブラムシ類	2000倍					
	アザミウマ類	2000倍					
えだまめ	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
さやいんげん かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
ねぎ	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000倍					
	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ アザミウマ類、ハモグリバエ類	2000~4000倍					
たまねぎ	アザミウマ類、ハモグリバエ類	2000倍					
やまのいも	ナガイモコガ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類	2000~4000倍					
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ アリモドキソウムシ、ヨツモンカメノコハムシ	4000倍					
	ハスモンヨトウ	2000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類	2000倍					
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	4000倍					
にんじん	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	4000倍					
	ムギクビレアブラムシ	2000倍					
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ、オオタバコガ	2000倍					
	ヨトウムシ	4000倍					
たばこ	ヨトウムシ	4000倍	100~ 180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	

混用事例

本表は実施した試験をもとに作成しておりますが、品種、栽培条件、使用濃度、使用時期などにより結果が異なる場合があります。したがって、本表で●であっても「薬害がない」ということを保証するものではありません。あくまでも混用知見の一例として考えていただきますようお願いいたします。(●は銅剤)

2020年6月30日現在

殺菌剤 compatibility table with columns for crop types (キャベツ, はくさい, etc.) and fungicide names (アグリマイシン100(水), アグレット(液), etc.).

殺虫剤 compatibility table with columns for crop types and insecticide names (アグロスリン(乳), アドマイヤー(FL), etc.).

展着剤 compatibility table with columns for crop types and adjuvant names (K.K.ステッカー, アイヤーエース, etc.).

記号の説明: ● 混用して問題なかった(●は銅剤), ◎ 使用直前の混用なら問題なかった, ▲ 薬害の事例があった, × 混用できない, 空欄 表記するに足りる知見や経験に乏しい

△効果・薬害等の注意: ●使用前によく振ってから使用してください。●使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。●散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。

△安全使用上の注意: ●誤飲などのないよう注意してください。●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。●本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。

●ラベルをよく読んでください。●記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。